

¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétonas, tos ferina	Hib Haemophilus influenzae tipo b	Polio	PCV Neumocócica conjugada	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela	HepA Hepatitis A	HPV Virus del papiloma humano	MCV4 Meningocócica conjugada	Influenza (Gripe)
Al nacer	✓											
2 meses	✓ (1 a 2 meses)	✓	✓	✓	✓	✓						
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓						
6 meses		✓	✓ ²			✓	✓ ²					
12 meses			✓ ³			✓						
15 meses		✓ ⁴ (15 a 18 meses)	✓ (12 a 15 meses)			✓ (12 a 15 meses)		✓ (12 a 15 meses)	✓ (12 a 15 meses)			
18 meses												
19 a 23 meses		Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)				Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵			
4 a 6 años		✓		✓				✓	✓			
7 a 10 años	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵										
11 a 12 años	✓ Tdap			Ponerse al día ⁵				Ponerse al dia ⁵	Ponerse al dia ⁵		✓✓✓ ⁶	✓
13 a 18 años	Ponerse al día ⁵ (Tdap/Td)									Ponerse al día ^{5,6}	Ponerse al dia ^{5,7}	

1. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna HepB a los 4 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.

2. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib ni de la vacuna RV a los 6 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.

3. Se recomienda una dosis para la mayoría de las personas. Los niños menores de 9 años que se van a vacunar contra la influenza por primera vez, o los que sólo recibieron 1 dosis durante la temporada anterior (si ésa fue la primera temporada en que se vacunaron), en esta temporada deben recibir 2 dosis, la segunda al menos 4 semanas después de la primera.

4. Esta dosis de DTaP se puede dar incluso a los 12 meses de edad, si pasaron 6 meses desde la dosis anterior.

5. Si se atrasa con alguna vacuna, o se le olvida por completo, su hijo debe recibirla lo antes posible.

6. Todas las niñas y mujeres de 11 a 26 años de edad se deben vacunar con 3 dosis de la vacuna HPV, a lo largo de un período de 6 meses. Los varones y hombres de 11 a 26 años también pueden recibir una de las vacunas HPV (Gardasil) para reducir la probabilidad de contraer verrugas genitales. La vacuna se puede dar incluso a niños de 9 años de edad.

7. Si tiene un adolescente que va a ir a la universidad y tiene planes de vivir en una residencia estudiantil, y no lo vacunaron antes contra la enfermedad meningocócica, se debe vacunar ahora.

Nota: Algunos niños pueden necesitar más vacunas. Hable con su profesional de la salud.